

Danish Colorectal Cancer Group (DCCG)

Faglige anbefalinger i forhold til COVID-19 pandemi

Kirurgisk behandling af primær tumor

Som udgangspunkt anbefales fortsat overholdelse af kræftpakkeforløb¹ og dermed operation indenfor 10 dage efter afsluttet udredning og indhentet samtykke.

Der anbefales dog i **hvert enkelt tilfælde**, om det er mere hensigtsmæssigt for patienten at afvige fra denne frist. En sådan afvigelse skal være baseret på bl.a.

- patientens symptomer (fx ingen stenosesymptomer)
- konkurrerende komorbiditet
- klinisk TNM kategori og/eller UICC stadium
- patologisk T1 kategori efter polypektomi/lokal excision
- mangel på kvalificeret personale
- positiv test for SARS-CoV-2 indenfor 2 døgn før elektiv operation

Ad a) Symptomer: Ved fx begyndende stenosesymptomer bør operation ikke udsættes.

Ad b) Udsættelse af operationsdatoen bør overvejes under pandemien grundet høj smitterisiko hos patienter med hjerte-lunge-sygdomme med fx reduceret lungekapacitet, kompromitteret immunfunktion og lignende. Det bør vurderes, hvorvidt disse patienter kan optimeres via tiltag, der ikke medfører hospitalsindlæggelse.

Ad c) I tilfælde af UICC I eller T1-3N0M0 sygdom kan operation udsættes under pågående pandemi med høj smitterisiko, såfremt patienten ikke har stenosesymptomer.

Ved UICC III og T4N0-2M0 tilstræbes pakkeforløbet overholdt, men afhængig af evt. konkurrerende komorbiditet og høj alder.

Operativ behandling af metastatisk sygdom med kurativ intention bør vurderes individuelt.

Ad d) *Completion surgery* efter fund af pT1 sygdom efter polypektomi/lokal excision bør operation så vidt muligt udsættes så længe pandemien er på sit højeste.

Ad e) Afvigelse af kræftpakkeforløbet kan være nødvendigt i tilfælde fx mangel på kvalificeret personale (bla. kirurgi, anæstesi, plejepersonale) udløst af pandemien.

Ad f) Såfremt en patient testes positiv i forbindelse med test udført i henhold til SST's anbefalinger før indlæggelse² bør operationen udskydes, såfremt der ikke er tarmkræft relaterede symptomer eller andre forhold der nødvendiggøre akut/fremskyndet operation. Øvrige anbefalinger iht håndtering af COVID-19 bør følges iht. SST's anbefalinger. Såfremt patienten ikke har udviklet COVID-relaterede symptomer, kan test foretages efter ca. 1 uge fra den positive test.

Hvis en test-positiv patient udvikler COVID-relaterede symptomer, bør patienten testes igen som minimum en uge efter symptomophør og operationsplanen kan genoptages ved negativ test. I tilfælde af symptomer med især pulmonale gener bør yderligere udskydelse / diagnostik overvejes.

Ovenstående revurderes ved behov og senest medio august 2020.

Lene Hjerrild Iversen og Ismail Gögenur

På vegne af DCCGs Bestyrelse og Kirurgisk arbejdsgruppe under DCCG

¹https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/kraeft/pakkeforloeb/-/media/Udgivelser/2019/Pakkeforloeb-kraeft-2015-2019/Tyk-endetarm-2016/Pakkeforloeb-for-kræft-i-tyk--og- endetarm---revision-sep-2016_endelig.ashx

²<https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19.ashx?la=da&hash=BE6BE868AA53E335DD6F7003AD134D5E5D8AD122>

Onkologisk behandling af kolorektal cancer

Som udgangspunkt anbefales at onkologisk behandling iværksættes indenfor de eksisterende behandlingsgarantier og behandlingsanbefalinger² og at allerede igangværende behandling fortsættes jf. de generelle anbefalinger ang. håndtering af patienter, som de onkologiske afdelinger ledelsesmæssigt har koordineret i overensstemmelse med SST's retningslinjer, og dermed sikrer en ensartet holdning henover landet.

Specielt vedr. valg af fraktionering ved præ-operativ strålebehandling af rectum cancer henvises til internationale (med dansk deltagelse) statement³

Camilla Qvortrup og Laurids Østergaard Poulsen

På vegne af DCCGs Bestyrelse og Onkologisk arbejdsgruppe under DCCG

² <https://dccg.dk/retningslinjer/vejledninger/#1528975701027-bc7d0bb0-ef75>

³ [https://www.thegreenjournal.com/article/S0167-8140\(20\)30173-0/fulltext](https://www.thegreenjournal.com/article/S0167-8140(20)30173-0/fulltext)