

27-03-2020

**Covid-19 anbefalinger fra DAHANCA's bestyrelse ang. håndtering af patienter, der måtte få deres stråleforløb ændret som følge af corona-krisen.**

Såfremt der sker en afbrydelse af strålebehandlingen, skal de(n) manglende fraktion(er) søges givet inden en uge. Dette kan ske ved enten at give ekstra fraktion(er) i weekend, eller ved at give ekstra behandling samme dag som en planlagt fraktion, men med et interval på mindst 6 timer. Kompensationen for en manglende behandling skal gives så hurtigt som muligt efter behandlingsafbrydelsen er opstået, såfremt patienten skønnes at kunne klare dette. Det er vigtigt, at den planlagte behandlingstid overholdes så stringent som muligt. Som hovedregel skal man dog ikke give mere end 1 ekstra fraktion pr. uge. Af hensyn til den akutte toksicitet må der ikke gives daglige behandlinger uafbrudt i mere end 13 dage, subsidiært, hvis der ikke behandles i weekend, må der ikke gives mere end 3 dage med 2 daglige behandlinger inden for 2 uger. Ved længerevarende pauser kan det være nødvendigt at kompensere pausen ved at anvende andre fraktioneringsmønstre, herunder evt. hyperfraktionering. Ændringer i udredning, behandling, opfølgning eller rehabilitering bør som udgangspunkt baseres på en individuel klinisk vurdering, og afvigelser fra normal praksis bør journalføres.

På vegne af DAHANCA  
Jørgen Johansen, overlæge, ph.d.  
Formand for DAHANCA